

Réf:
DERMATOLOGIE-PRO00655
ACHHMN_PPA080
Version: 2
Page: 1/4

Limite de validité : 01/09/2022

Établissement(s) d'application : Hôpital Albert-Chenevier, Hôpital Henri-Mondor

Rédigé par : (nom, fonction, date)	Validé par : (nom, fonction, date)	Approuvé par : (nom, fonction, date)
Aude THIENG-HENG-DIEN Cadre de santé Service de Dermatologie	Dr Saskia ORO Coordinatrice du centre de référence TOXIBULL Service de Dermatologie Brigitte SILVERA CSSP DSAP	Fabien GOURDON Directeur DURCQ
3/04/2023	3/04/2023	Date d'approbation
Objet de la modification : Mise à jour de la procédure (date de validité)		
Groupe de travail : Anne-Divine NZAOU KIMPOLO, IDE et Audrey COLIN, IDEC		

1. OBJET

Décrire les spécificités des soins génitaux chez les patients ayant un syndrome de Lyell, Stevens- Johnson, érythème polymorphe avec une atteinte sévère de la muqueuse génitale.

Eviter l'apparition de séquelles, favoriser la cicatrisation

2. DOMAINE D'APPLICATION ET PERSONNES CONCERNEES

Le protocole de soins s'applique dans le service de Dermatologie

Responsabilités : Médecins et infirmières du service de Dermatologie.

3. REFERENCES

- PNDS Nécrolyse épidermique toxique (septembre 2023)
- PNDS dermatoses bulleuses auto-immunes (avril 2020)

4. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

Lyell (ou nécrolyse épidermique toxique : NET, surface décollée/décollable ≥30%) et syndromes de Stevens-Johnson (surface décollée/décollable <10%) sont des maladies dermatologiques aiguës très graves, majoritairement causées par la prise de médicaments (80%) et caractérisées par la destruction brutale de l'épiderme et des épithéliums muqueux.

Erythème polymorphe : éruption cutanée et muqueuse aigüe récidivante (parfois lors de récurrence herpétique)

Pemphigoïde bulleuse, pemphigoïde des muqueuses ou pemphigoïde cicatricielle, pemphigoïde de la grossesse, épidermolyse bulleuse acquise, dermatose à IgA



Réf : DERMATOLOGIE-PRO-00655 ACHHMN_PPA080

> Version : 2 Page : 2/4

Limite de validité : 01/09/2022

Établissement(s) d'application : Hôpital Albert-Chenevier, Hôpital Henri-Mondor

linéaire : groupe de plusieurs maladies auto immunes très proches avec atteinte de la peau et parfois des mugueuses.

Pemphigus: maladie auto-immune touchant la peau et les muqueuses.

Toutes ces maladies partagent la problématique commune des risques inhérents aux décollement de la peau et des muqueuses (infections, déshydratation, dénutrition, risque de séquelles muqueuses...

Abréviations

DASRI : Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés

FHA: Friction Hydro Alcoolique SHA: Solution Hydro Alcoolique

5. Matériels et équipements

Protections individuelles et hygiène:

- Gants de soins à usage unique
- Solution Hydro-Alcoolique (SHA)
- Sacs DASRI et DMA
- Equipement de protection selon règles d'hygiène standard ou complémentaire (Surblouse, tablier imperméable, masque de soins, gants de soins, charlotte)

Matériel de soin :

Matériel standard pour toilette, vaseline, compresses, 1 gant stérile ou1 préservatif.

Matériel standard pour toilette, vaseline, compresses, 1 gant stérile ou 1 préservatif.

5.2. Recommandations

- Sur prescription médicale
- 2 Soin à réaliser 2 fois par jour, au lit du patient

5.3 Déroulement du soin

Avant le soin :

- Prévenir le patient du soin : lui expliquer le processus, le prévenir que le soin peut être douloureux.
- Evaluer la douleur (Echelle Numérique),



Réf : DERMATOLOGIE-PRO-00655 ACHHMN_PPA080

> Version : 2 Page : 3/4

Limite de validité : 01/09/2022

Établissement(s) d'application : Hôpital Albert-Chenevier, Hôpital Henri-Mondor

- Administrer sur prescription médicale, un antalgique (morphine) et un anxiolytique (hydroxyzine)
- Faire une FHA
- Mettre la surblouse, le tablier imperméable, masque de soins, gants de soins

✓ <u>FEMME</u>

Soins applicables pour les patientes en période d'activité génitale en leur expliquant toutes les étapes indispensables du soin

Pendant le bain :

- Effectuer une toilette douce de la vulve pour éliminer les exsudats et la muqueuse nécrosée,
- Rompre avec précaution les brides entre les lèvres (sans léser d'avantage la muqueuse)
- o Retirer gants de soins
- Faire une FHA

Après le bain :

- Disposer des compresses roulées dans le préservatif ou dans le doigt d'un gant stérile, et enduire la face externe de vaseline.



- Demander à la patiente ou au soignant d'appliquer ce dispositif en intra vaginal, effectuer un mouvement circulaire (les brides pourront être rompues grâce au mouvement circulaire) puis l'enlever délicatement. Ne pas le laisser en place.
- Mettre des gants si soin fait par le soignant

✓ <u>HOMMES</u>

Pendant le bain :

- Décalotter
- Effectuer une toilette douce pour éliminer les exsudats, la muqueuse nécrosée et rompre les brides (sans léser d'avantage la muqueuse)
- Recalotter

Après le bain 2 fois par jour.



Réf : DERMATOLOGIE-PRO-00655 ACHHMN_PPA080

> Version : 2 Page : 4/4

Limite de validité : 01/09/2022

Établissement(s) d'application : Hôpital Albert-Chenevier, Hôpital Henri-Mondor

- o Bien sécher,
- o Décalotter et appliquer la vaseline,
- o Recalotter,

Fin du soin:

- Réinstaller le patient, évaluer la douleur (Echelle Numérique)
- retirer les équipements de protections
- Effectuer une FHA
- Eliminer les déchets en respectant la filière d'élimination

5.4 Transmissions

Effectuer une transmission

- Noter l'évaluation de la douleur (Echelle Numérique) avant et après le soin et administrer un antalgique selon prescription médicale
- Noter le soin dans le dossier du patient sur le diagramme de soin et validation du soin sur la prescription médicale

6. Annexe

Néant